



طب أسنان الأطفال و تقويم الأسنان

التخدير الموضعي

عزيزي الوالدا ولي الأمر،

لقد تلقى طفلك تخديرا موضعيا (تجميد) لإتمام اجراء علاج الأسنان. عادة يترك التخدير لدى الطفل الإحساس بانتفاخ الشفة لمدة أربع إلى خمس ساعات. هذا الإحساس مقلق لمعظم الأطفال و كثير منهم سوف يسحب، يخدش، يمص أو حتى يعض الشفة أو الخد أو اللسان في حالة التخدير . هذا قد يؤدي إلى قرحة و تورم مؤلمين.

لمنع المضاعفات

- لا تسمح لطفلك بتناول أي طعام أو شراب ساخن حتى يتلاشى احساس التخدير (التجمد).
- في هذه الفترة، الأفضل لطفلك هو الطعام الدافئ أو البارد (الذي يحتاج قدر قليل من المضغ) و المشروبات. معظم الأطفال يحبون المصاصات المثلجة أو الحليب المخفوق (ميك شيك)
- **راقب طفلك**. إذا بدأ الطفل بمص أو عض شفته، خده أو لسانه، ضع قطعة من الشاش بين الأسنان بحيث يعضها الطفل بدل أن يعض نفسه.

الرجاء عدم التردد في الاتصال بنا إذا ظننت أن الطفل قد اذى نفسه.
اتصل على 519-679-6822